

الاسماء التجارية Trade Names	الاسم العلمي أو المكونات Scientific Name or Active Substances	دواعي الاستعمال Indications	موانع الاستعمال Contraindications
ابيدكس Apidex	<i>Dexamethasone sodium ph.+ Benzalkonium chloride</i>	لمعالجة أمراض العين الالتهابية كالتهاب الملتحمة الجفني والبصلي ، التهاب القرنية ، والقسم الأمامي من الكرة العينية .	لا ينصح في معالجة داء القوباء السطحي الحاد وجذري البقر ومعظم الأمراض الفيروسية الأخرى ، لا يستعمل لفترة طويلة .
ابيكورت Apicort	<i>Prednisolone acetate + Benzalkonium chloride</i>	علاج الالتهابات التي تستجيب للستيرويد والأعراض التحسسية غير الخمجية الخفيفة المتوسطة للجفن والملتحمة البصلية والقسم الأمامي للعين والقرنية .	لا ينصح باستعمالها في معالجة الاحماج العينية القيحية الحادة ، وداء القوباء السطحي الحاد ، وجذري البقر ومعظم الأمراض الفيروسية الأخرى للقرنية والملتحمة .
ابيمول Apimol تيمولير Timolyre	<i>Timolol maleate</i>	في خفض الضغط الداخلي للعين ، وفي الجلوكوما المزمنة والجلوكوما الثانوي.	الربو القصبي ، بطء القلب الجيبي ، الصدمة القلبية ، لا ينصح للحوامل وكذلك الأطفال
أتوكاين Otocain	<i>Phenazone + Procaine HCL</i>	التهاب الأذن الوسطى ، التسكين الفوري للألم وتخفيف الالتهاب في المراحل الاحتقانية ، وكعلاج مساعد مع المضادات الحيوية	في حالة وجود ثقب في طبلة الأذن ، للحوامل إلا للضرورة ، ويعطى بحذر للمرضعات ، لا يستعمل أكثر من ١٠ أيام .
ادلانت Adalat	<i>Nifedipine</i>	ارتفاع ضغط الدم الذبحة الصدرية .	يعطى بحذر في حالات اختلال كلوي أو كبدية ، المرضى المسنين ، عدم انتظام ضربات القلب البطيئة ، لا يعطى الأطفال والإرضاع الحمل فئة C .
اريثرومايسين Erythromycin	<i>Erythromycin</i>	عدوى الجهاز التنفسي ، السعال أديكي ، الالتهاب الرئوي ، الدفتريا ، الاميبا المعوية ، التهاب الجلد ، التهاب الجهاز البولي والتناسلي .	يستعمل بحذر للمرضى الذين لديهم خلل في وظائف الكبد ، يستعمل بحذر في الرضاعة الحمل فئة B .
ازثرومايسين Azithromycin أزي ونس Azi-once	<i>Azithromycin</i>	التهاب الجهاز التنفسي ، التهاب الأذن الوسطى ، التهابات الجلد ، الكلاميديا	لا يستعمل في حالات القصور الكبدي الحاد ، يستعمل في الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصوى .
اسبجك Aspegic	<i>Acetylsalicylic acid Lysine</i>	التهاب المفاصل الروماتيزم ، هشاشة العظام ، ألم خفيف إلى معتدل ، الحمى	في حال حدوث حساسية مع المسكنات الأخرى ، اضطرابات النزف أو الصفائح ، يعطى بحذر في القرحة ، أمراض الكلى الشديدة أو كبدي حاد ، في الحمل لا يستعمل ابتداء من الشهر السادس للحمل ولا يستعمل أثناء فترة الإرضاع .

أسبرين Aspirin	Acetylsalicylic acid	التهاب المفاصل الروماتيزم ، هشاشة العظام ، ألم خفيف إلى معتدل ، حمى ، الوقاية من النوبة الصدرية.	حساسية مع المسكنات الأخرى ، اضطرابات النزف أو الصفائح ، يعطى بحذر في القرحة ، أمراض الكلى الشديدة أو كبدى حاد ، الحمل فئة D خلال الأشهر الثلاثة الأولى
اسماسام Asmasam	Theophylline + Ephedrine	على المدى الطويل مراقبة انسداد مجرى الهواء الناجم عن انعكاس أو الربو المزمن .	لا يعطى في حالة عدم انتظام ضربات القلب غير المنضبط ، فرط الدرقية ، الحمل فئة C .
افاس Avas	Atrovastatin	ارتفاع الكوليسترول في الدم وخلل دهون الدم المختلط .	لا يعطى في حالات أمراض الكبد النشطة ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع .
أكت-3 Act-3	Paracetamol + Dextromethorphan + Pseudoephedrine HCL	لتسكين الألم الصدغي وأعراض البرد والرشح ، لتخفيف الآلام ، في حالات الاحتقان الأنفي ، الصداع ، التهاب الحلق ، السعال ، خافض حرارة .	يستعمل بعد الاستشارة في الحالات : الأمراض القلبية ، ارتفاع ضغط الدم ، أمراض درقية ، سكري ، تضخم البروستات ، الحمل والإرضاع
اكتفيد Actifed	Pseudoephedrin HCL + Triprolidine HCL	لنزلات البرد والأنفلونزا ، التهاب الجيوب الأنفية ، مزيل للاحتقان ، التهاب الأذن ، التهاب الأنف الموسمي .	تناول مع مهدئات الجملة العصبية ، يستعمل بحذر عند المرضى المصابين باختلال في وظيفة المثانة وفشل شديد في وظائف الكبد والكلى ، يعطى أثناء الحمل والإرضاع للضرورة فقط .
اكسدیل Exidil	Theophyllin + Glyceryl guacolate	موسع للقصبات الهوائية ومقشع	تجنب استعماله للأطفال اقل من سنتين بسبب خطر حدوث تحفيز للقلب والجهاز العصبي
امبي كلوكس Ampiclox	Ampicillin + Cloxacillin	التهاب القصبات ، التهاب اللوزتين والبلعوم والأذن ، التهاب الكلية والمثانة والاحليل ، التهاب العظم والنقي ، التهاب الجلد والأنسجة ، تجرثم الدم ، التهاب شغاف القلب ، التهاب السحايا ، التهابات ما بعد العمليات .	لا يعطى للمرضى المصابين بانتانات وحيدات النوى ، يعطى بحذر في حالات القصور الكبدى والكلى وفي الإرضاع (الحمل فئة B)
املونك Amlong اماداي Amaday لوفرال Lofral	Amlodipine	في إدارة ارتفاع ضغط الدم والنوبة الصدرية .	يعطى بحذر في اختلال كبدى حاد ، المرضى المسنين ، تضيق الأبهر (الحمل فئة C)
اموكسيل Amoxyl	Amoxicillin	التهاب القصبات ، التهاب اللوزتين والبلعوم والأذن ، التهاب الكلية والمثانة والاحليل ، التهاب العظم والنقي ، التهاب الجلد والأنسجة ، تجرثم الدم ، التهاب شغاف القلب ، التهاب السحايا ، التهابات ما بعد العمليات .	يستخدم بحذر عند المرضى المصابين باضطراب شديد في الوظيفة الكبدية ، تعديل الجرعة في حالات الفشل الكلوي المتوسط إلى الشديد ، وفي الإرضاع (الحمل فئة B)

Amikacin اميكاسين Amikacin	علاج الالتهابات الجرام سلبية خطيرة العصوي والالتهابات التي تسببها العنقوديات عند موانع بنسليبات أو غيرها من المخدرات أقل سمية	تجنبها في المرضى الذين يعانون من التعصب ، في حديثي الولادة ، يعطى بحذر ضعف السمع ، والأطفال الخدج ، السمنة المرضى. / الرضاعة ، والرضع وحديثي الولادة (لم يثبت سلامة) الحمل فئة . C
Diphenoxylate HCL + Atropin sulphate انترستوب Enterostop لوموتيل Lomotil	مضاد للإسهال .	الذين يعانون من أمراض الكبد الحادة ، الإسهال المرتبطة بالتهاب القولون الغشائي الكاذب ، الأطفال دون سنتين ، الحمل فئة . c
Nitroglycerin انجيسيد Angised	الألم الصدري الحاد الناجم عن الذبحة الصدرية ، احتشاء القلب .	انخفاض الضغط الشديد ، فقر الدم الشديد ، ارتفاع الضغط داخل القحف بسبب الرض أو النزف الدماغي ، الحمل والإرضاع .
Losartan potassium + Hydrochlorothiazide انجيزار H Angizaar –H	علاج ارتفاع ضغط الدم .	لا يعطى للأشخاص الذين لديهم احتباس البول ، لا يعطى للحوامل والمرضعات
Indomethacin اندوسيد Indocid	التهاب المفاصل الروماتيزم ، التهاب المفاصل النقرسي ، هشاشة العظام التهاب الفقرار المقسط ، مسكن للآلام	لا يعطى في حالة القرحة ، التهاب المستقيم ، يعطى بحذر للمرضى المسنين ، الإرضاع والحمل
Propranolol انديرال Inderal	ارتفاع ضغط الدم ، اضطراب نظم القلب ، تسرع ضربات القلب ، اعتلال العضلة القلبية ، الاحتشاء	لا يجوز الاستعمال في حالات الصدمة القلبية ، انسداد المجاري التنفسية ، حصار قلبي ، تباطؤ ضربات القلب لا يستعمل في الحمل والإرضاع
Tobramycin + Dexamethasone اوبتيديكس ت Optidex T	لمعالجة حالات العين المستجيبة للاستيرويدات والتي تتطلب في نفس الوقت المعالجة الوقائية بالمضادات الحيوية ، لمعالجة حالات التهاب الملتحمة	التهاب القرنية السطحي القوباء البسيط ، إصابة العين الناتجة من البكتريا الفطرية ، الجلوكوما (الماء الأزرق) لا ينصح في الحمل والرضاعة .
Ketorolac tromethamine + Benzalkonium chloride + Edetate disodium + Octoxynol + Sodium chloride اوبتيلار Optilar	يستعمل للإزالة المؤقتة للحكة العينية الناجمة عن التحسسي الموسمي للملتحمة ، لعلاج التهاب التالي للعمليات عند المرضى الذين أجريت لهم عملية استخراج الساد .	لا يعطى للذين لديهم حساسية من مضادات الالتهاب الغير ستيروئيدية ، لا ينصح للحوامل والمرضعات وكذلك الأطفال دون ١٢ سنة .
Xylometazoline HCL + Benzalkonium chloride + Sodium phosphate + Sodium chloride + Methylhydroxypropylcellulos أوتريفين Otrivin	مزيل احتقان الأنف ، للمساعدة في تصريف الإفرازات الأنفية ، إزالة احتقان الغشاء المخاطي للبلعوم ، تسهيل تنظير الأنف	بعد التداخلات الجراحية ، لا يستعمل أثناء الحمل ، يستعمل تحت إشراف طبي أثناء الإرضاع ، لا يستعمل على مدى فترات طويلة .

أوفتاديكس Ophtadex	<i>Dexamethasone sodium phosphate</i>	الحالات الالتهابية المستجيبة للستيروئيدات في الملتحمة الجفنية والبصلية ، والقرنية ، والقسم الأمامي لكرة العين	التهاب القرنية الظهاري الحلئي الحاد ، الأمراض الفطرية لمكونات العين التصنيف بالنسبة للحمل النمط . C
أوفتازولين Ophthazolin	<i>Antazoline sulphate + Naphazoline nitrate + Benzothionum chloride</i>	معالجة التهاب ملتحمة العين المتهيجة والملتحمة التحسسية (نزلة العين الربيعية)	لا تستعمل بعد أربعة أسابيع من فتحها
أوفتاميزون N Ophtamesone-N	<i>Betamethasone sod. + Neomycin sulphate + Thiomersal</i>	تستعمل في حالات الحساسية والتهاب في العين والأذن والأنف .	في حالات الجلوكوما ، والالتهاب الفيروسي أو الطفيلي للعين ، وجود ثقب في طبلة الأذن .
أوكمنتين Augmentin اموكسيكلاف Amoxiclave	<i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i>	التهاب القصبات ، التهاب اللوزتين والبلعوم والأذن ، التهاب الكلية والمثانة والاحليل ، التهاب العظم والنقي ، التهاب الجلد والأنسجة ، تجرثم الدم ، التهاب شغاف القلب ، التهاب السحايا ، التهابات ما بعد العمليات .	يعطى بحذر في حالات القصور الكبد والكلي وفي الإرضاع الحمل فئة . B
اولان Olan	<i>Olanzapine</i>	إدارة الاضطرابات الذهنية بما في ذلك الهوس والنوبات الحادة المرتبطة ، الهوس الاكتئابي ، علاج الفصام .	يعطى بحذر في اختلال كلوي ، المسنين تضخم البروستات ، الجلوكوما ، الأطفال دون ١٨ سنة الحمل فئة . C
أومني Omni	<i>Cefdinir</i>	التهاب البلعوم ، التهاب اللوزتين ، التهاب الأذن الوسطى ، التهاب الجلد والأنسجة الرخوة .	تعديل الجرعة عند المرضى المصابين بقصور كلوي ، لا ينصح لحديثي الولادة والرضع اقل من ٦ أشهر الحمل فئة . B
ايزورديل Isordil	<i>Isosorbide dinitrate</i>	في معالجة الذبحة الصدرية وللوقاية منها ، وفي معالجة القصور القلبي .	في حالات الذبحة الصدرية العرضية التي تظهر في سياق بعض الأمراض كعرض لنقص الأوكسجين مثل فقر الدم . النزيف الدماغي ، الجلوكوما ، يجب الحذر عند الاستعمال خلال فترة الإرضاع ، لا يستعمل خلال الحمل إلا للضرورة القصوى .
ايزيلين Isilin	<i>Diphenhydramine HCL + Ammonium Chloride</i>	مضاد للسعال ، طارد للبلغم مضاد للحساسية .	يستخدم بحذر في حالات تضخم البروستات واحتباس البول وانسداد الاثني عشر وأمراض الكبد والفشل الكلي وفي الصرع ، في الحمل والإرضاع يستعمل للضرورة القصوى
اينابريل Enapril	<i>Enalapril</i>	فرط ضغط الدم الأساس والخبيث معالجة قصور القلب الاحتقاني .	يجب ضبط الجرعة بدقة لمرضى الاعتلال الكلوي ، الحمل فئة C الفترة الأولى من الحمل وفئة D الفترة الثانية والثالثة من الحمل

التهاب القرنية ، وامرض فيروسية أخرى للقرنية والملتحمة ، إصابة العين بالمتفطرات ، داء فطريات مكونات العين ، في الحمل والإرضاع للضرورة	في حالات التهاب العين ، وفي حالات التهاب العنبية المزمن وجروح القرنية الناتجة عن حروق كيميائية أو اختراق أجسام غريبة .	<i>Dexamethasone + Neomycin sulfate + Polymyxin B sulfate</i>	ب.ن.د P.N.D
يعطى بحذر للمرضى المصابين بأمراض القلب ، الكبد ، الاضطرابات النفسية ، القرحة المعدية ، لا يعطى للحوامل .	الاضطرابات الغذائية المترافقة مع ارتفاع بروتينات الدم ، العناية والعقم عند الرجال ، متلازمة المبيض متعدد الكيسات ، الطمث ، الم واحتقان الثدي ، لمعالجة داء باركنسون .	<i>Bromocriptin</i>	بارلوديل Parlodel رونالين Ronalin
لا يستعمل بحالة فطريات الجلد .	يستعمل للحساسية والالتهابات الجلدية .	<i>Betamethasone + Neomycin</i>	بتنوسام N Betnosam-N
تجنب المنتجات التي تحتوي على الكحول ، يعطى بحذر لأمراض الكبد / مرض كلوي سوء التغذية ، الحمل الفئة (B)	مسكن للألام خافض للحرارة	<i>Acetaminophen</i>	براسيتول paracetol
يستخدم أقل جرعة ممكنة لأقصر فترة من الزمن في الحالات التالية : الأطفال الأمراض المزمنة الحمل فئة C)	تستخدم في طائفة واسعة من الأمراض / التهابي ، الحساسية ، الأورام ، حالات الربو .	<i>Prednisolone</i>	بردنزولون Prednisolone
لا يستعمل للحوامل والمرضعات .	أعراض تضخم البروستات الحميد ، ارتفاع ضغط الدم الخفيف أو المعتدل	<i>Terazosin hydrochloride</i>	بروستانور Prosta-nor
لا يعطى مع المسكنات الأخرى ، حالات القرحة ، الحمل الفئة B ، في الثلث الأول	مسكن للألام ، التهاب المفاصل ، هشاشة العظام ، خفض الحمى .	<i>Ibuprofen</i>	بروفين Brufen
لا يستعمل خلال الحمل والإرضاع .	البواسير الشرجية والحكة والألم والحرقة المرافقة لها .	<i>Cinchocaine HCL + Hydrocortisone</i>	بروكتوسيديل Proctosedyl
لا يوجد / أمن للحوامل والرضع والأطفال وكبار السن	الحكة المصحوبة ببغم ، حساسية الصدر ، التهاب الجهاز التنفسي السفلي	<i>Lobelia Tinct. + Scilla Tinct. + Liquorice Ext. + Stramonium Tinct.</i>	برونكيوم Broncho
لا يعطى لحديثي الولادة والخدج ، لا يستخدم لدى الأمهات المرضعات ، الجلوكوما ، القرحة الهضمية ، تضخم البروستات انسداد عنق المثانة ، يعطى بحذر في الربو المزمن ، ضغط العين المرتفع ، فرط نشاط الدرق ، المرض القلب الوعائي ، ارتفاع الضغط الشرياني ، يعطى أثناء الحمل للضرورة فقط .	التهاب الأنف التحسسي الموسمي ، التهاب الملتحمة التحسسي ، لتحسس الجلدي ، الحكة الجلدية ، يستعمل كفاتح للشهية .	<i>Cyproheptadine</i>	برياكتين Periactin

يسكوبان Buscopan انتي سبازمين Anti spasmen	Hyoscine-n-butyl bromide	تشنجات الجهاز الهضمي ، تشنج الاقنية الصفراوية ، تشنجات الجهاز البولي ، عسر الطمث ، الاقفاء بعد العمل الجراحي	لا يعطى في الجلوكوما ، تسرع القلب ، ضخامة البروستات واحتباس البول ، الوهن العضلي الوخيم ، يعطى بحذر خلال الإرضاع والحمل خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل .
بكتومكس Pectomex	Diphenhydramine + Phenylephrine HCL + Ammonium chloride + Tolu Balsam	السعال بكافة أنواعه ، الأنفلونزا ونزلات البرد الراشحة ، الحالات التحسسية التي تصيب الجهاز التنفسي ، التهاب البلعوم والقصبات والجيوب .	القصور الكلوي أو الكبدي ، فقر الدم الانحلالي .
بكتوميدي pectomed	Dextromethorphan HBr + Guaifenesin + Mepyramine maleate	لمعالجة السعال الجاف .	سعال ربوي ، قصور تنفسي ، الجلوكوما ، انحباس بول بسبب اضطرابات بولية بروتينية ، لا يعطى خلال الإرضاع ، لا يعطى في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل .
بلاسيل Mecludin	Metoclopramide HCL	مضاد للقيء ، علاج ركود المعدة بعد الجراحة والسكري .	يعطى بحذر في مرض السكري ، قد يغير الاستجابة للأنسولين ، الأطفال ، والمرضى ، المسنين ، الحمل الفئة (B
بلافكس Plavix	Clopidogrel	مضاد لتجلط الدم ، الحد من تصلب الشرايين ، السكتة الدماغية .	لا يعطى في حالات القرحة الهضمية ، نزف داخل القحف ، الإرضاع يعطى بحذر في الحمل وللاطفال .
بلموكلوكس Pulmoclox	Amoxicillin + Cloxacillin	التهاب القصبات ، التهاب اللوزتين والبلعوم والأذن ، التهاب الكلية والمثانة والاحليل ، التهاب العظم والنقي ، التهاب الجلد والأنسجة ، جراثيم الدم ، التهاب شغاف القلب ، التهاب السحايا ، التهابات ما بعد العمليات	يستخدم بحذر عند المرضى المصابين باضطراب شديد في الوظيفة الكبدية ، تعديل الجرعة في حالات الفشل الكلوي المتوسط إلى الشديد ، وفي الإرضاع (الحمل فئة . B
بلموكودين Pulmocodin	Glyceryl Guaiacolate + Chlorpheniramine + Phenylephrine + Codeine phosphate + Vitamin C	معالجة السعال ، مضاد للهساسية ومهدئ	الإمساك ، يعطى بحذر لمرضى الربو ، الأطفال أقل من سنتين
بولارامين polaramine	Dexochlorphenaramine	مضاد للحساسية ، معالجة السعال المترافقة باضطرابات تحسسية ، مضاد احتقان .	لا يستعمل عند حديثي الولادة والخدج ، الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية ، المرضى ذوي ارتفاع ضغط دم شديد ، يستعمل في الحمل للحاجة فقط في الأشهر الستة الأولى من الحمل لا يجوز في الأشهر الثلاثة الأخيرة ، يجب اخذ الحذر للمرضعة .
بولي كورت Polycort	Oxytetracycline + Hydrocortisone acetate + Polymixin-b-sulphate	التهابات الجرثومية الحادة للعين ، التراخوما ، التهاب ملتحمية الشامل ، التهاب القزحية والصلبة ، التهاب الجفن ، كلاميديا ، الإصابات العينية .	لا يستعمل في : الأمراض الفطرية ، الفيروسية ، بعض حالات الجلوكوما ، التهاب القرنية المتشعب . يعطى بعد الاستشارة في الحمل .

لا يوصف للمرضى الذين يعانون منقصور شديد في وظيفة الكلينتين ، ولا يوصف في التهاب الأمعاء أو قرحة الأمعاء وقرحة المعدة ، لا يستعمل عند الإرضاع . الحمل فئة C))	لتخفيف الألم البسيط أو المتوسط الشدة وحالات الصداع .	Mefenamic acid	بونستان Ponestan ميفين Mefen
أمراض القناة الهضمية الانسدادية .	المغص المعوي والمعدى ، تقلص فتحتي البواب والفؤاد بالمعدة ، القيء .	Pipenzolate methylbromide + Phenobarbital	بيبي تال Baby tal
لا يوجد .	مضاد تشنج ، طارد للرياح ، مهدئ .	Diphenhydramine + Belladonna Tincture + Cardamon Tincture	بيبي- كالم Bebe- calme
لا يوجد .	المغص عند الأطفال والغازات والنفخة وعسر الهضم .	Simethicone	بيبي كون Baby cone
التهاب الجلد حول الفم ، الإصابة الجرثومية لقشرة الرأس ، الإصابة الجلدية الفيروسية ، يستعمل بحذر في الإرضاع ، لا يستعمل في الحمل .	لمعالجة الصدفية والإصابات الجلدية المتقرنة .	Betamethasone + Salicylic acid	بيتا ساليك Beta-salic
القرحة المعدية العفجية ، يحذر إعطاء هذا الدواء عند مرضى الربو والحوامل	المعالجة العرضية للدوار أدھليزي ، لمعالجة داء منيير (دوار ،طنين ، غثيان)	Betahistine dichlorhydrate	بيتاسيرك Rabestine رابتستين
يعطى بحذر في حال وجود الجلوكوما ، احتباس بولي ، لا يستعمل أثناء الحمل والإرضاع	للمعالجة الوقائية للصداع الوعائي المنشأ المتكرر بما فيه الشقيقة والصداع النصفي ذو المنشأ العصبي.	Pizotifen	بيزوفين Pizofen
لا يستعمل عند المرضى المصابين بصدمة قلبية ، إحصار أذيني بطيني ، بطء قلبي واضح ، الحذر عند الإعطاء للأمهات المرضعات (الحمل فئة C)	للتحكم بارتفاع التوتر الشرياني ، لخفض ضغط الدم.	Bisoprolol	بيزوكور Bizocor
في حالة القصور الكبدي او الكلوي ، يجب استشارة الطبيب للحوامل والمرضعات .	الآلام وإزالة التشنجات وتخفيض الحرارة ، الصداع . ألم الأسنان ، ألم عسر الطمث	Dextropropoxyphen + Paracetamol	بين استوب Pain stop دولو استوب Dolo stop
لا يستعمل عند وجود إصابات جلدية (جروح أو التهاب .) لا يستعمل عند الحمل أو المرضع أو الأطفال دون سن الثانية عشر إلا باستشارة الطبيب.	لمعالجة حب الشباب .	Benzoyl Peroxide	بينوكسيد جل Ben-oxide
يعطى بحذر للذين يعانون من أمراض القلب والسكري والجلوكوما والمسنين ، (الحمل فئة C)	موسع للشعب الهوائية عند نوبات الربو والأمراض الأخرى .	Salbutamol	بيوتادين Butadiene فنتولين Ventolin
يعطى بحذر في حالات أمراض الكبد والكلى ، احتباس البول ، تضخم البروستات ، انخفاض ضغط الدم ، داء السكري ، لا يعطى في الجفاف الأطفال دون ١٢ سنة ، (الحمل فئة C)	مدر للبول ، إزالة السوائل الزائدة في الجسم ، وفي حالات زيادة السوائل واحتباسها في الجسم ، يستخدم أيضاً لعلاج ارتفاع ضغط الدم .	Bumetanide	بيورنيكس Burinex

يعطى بحذر في اختلال كلوي أو كبدي الوهن المرضي الحمل فئة (D)	الوقاية من التهاب الشعب الهوائية المزمن من التفاقم ، التهاب اللثة ، علاج السيلان .	<i>Tetracycline</i>	تتراسايكلين Tetracycline
الحساسية لأحد مكوناتها ، في حالة الحمل ، الإصابة بجذري الماء أو السل وجود الدوخة أو مشاكل سمعية ، عند وجود ثقب في طبلة الأذن .	التهاب الأذن الخارجية والقناة السمعية بسبب جرثومي أو فطري ، تخفيف الحكة ، الحرقه ، الحساسية	<i>Triamcinolon Acetonide + Neomycin sulfate + Gramicidin + Nystatin</i>	تري - أوتيك Tri - Otic
يعطى بحذر في الجلوكوما ، تضخم البروستات ، فشل القلب الحاد ، يعطى بحذر أيضاً في الحمل والإرضاع .	مضاد للحساسية	<i>Clemastin</i>	تفاجيل Tavagyl
تحدث حساسية مع مضادات الاكتئاب الأخرى ، الجلوكوما ، المسنين ، تضخم البروستات ، (الحمل فئة (C)	مهدئ ، وفي حالات سلس البولي ، اتقاء الأوعية الدموية والصداع .	<i>Imipramine HCL</i>	تفرانيل Tofranil
يعطى بحذر في حالات اختلال كلوي ، المرضى المسنين ، وفي الحمل والإرضاع .	علاج قرحة الاثني عشر وقرحة المعدة ، العلاج والوقاية من حرقة المعدة وعسر الهضم الحمضية والحامض في المعدة ، الوقاية والعلاج من التوتر الناجم عن النزيف في الجهاز الهضمي العلوي	<i>Cimetidine</i>	تكاميت Tagamet
يعطى بحذر في حالات أمراض القلب ، أمراض الكبد ، المسنين ، تضخم البروستات الحمل فئة (C)	علاج الصرع ، بعض آلام الأعصاب ، الصداع النصفي .	<i>Carbamazepine</i>	تكريتول Tegretol
تناذر جيبى ، قصور بطيني أيسر ، حصار أديني بطيني ، لا يوصف للحامل أو المرضع أو الأطفال .	العلاج الوقائي لهجمات خناق الصدر خاصة عند الجهد ، معالجة ارتفاع التوتر الشرياني الأساسي	<i>Diltiazem</i>	تلديا Tildia
الامساك ، يعطى بحذر لمرضى الربو.	مضاد للسعال عند الاطفال	<i>Glyceryl guaiacolate + Chlorphenarmine maleat + Phenylephrine HCL</i>	توسليت Tussilet
الامساك ، يعطى بحذر لمرضى الربو ، الاطفال اقل من سنتين .	مهدئ للسعال الجاف ، موسع للشعب الهوائية ، مضاد للحساسية	<i>Chlorpheniarmine maleat + Phenylephrine HCL + Ephedrine HCL + Codeine phosphate</i>	توسيرام Tussiram توسيفان Tussivan
لا يستعمل في حالة الحمل والإرضاع.	معالجة السعال الجاف والارجي .	<i>Dextromethorphan HBr + Oxomemazine HCl + Sodium Benzoate</i>	توكسيل Toxil
في الحمل والإرضاع يجب استشارة الطبيب ، لا تستعمل هذا الدواء مع أدوية أخرى تحتوي براسيتول .	مسكن للسعال و مضاد للاحتقان ومضاد تحسس ومسكن آلام وخافض للحرارة .	<i>Paracetamol + Chlorpheniramine + Dextromethorphan HBr + Pseudo-Ephedrine HCl</i>	تولين D Tullin-D
وجود عدسات لاصقة ، يجب استشارة الطبيب للحوامل والمرضعات قبل الاستعمال .	التخفيف المؤقت من الحرقه والتهيج الناجم عن جفاف العين ، الوقاية من حدوث تهيج آخر	<i>Glycerin + Hypromellose + Polyethylene glycol</i>	تيرموند Tearmond

تيمودور Timodor	<i>Dorzolamide hydrochloride + Timolol maleate</i>	لخفض الضغط المرتفع في العين ومعالجة الزرق	مرض في الجهاز التنفسي مثل الربو ، أمراض معينة في القلب ، اضطرابات كلوية شديدة ، لا يجوز الاستعمال أثناء الحمل والإرضاع وللأطفال .
تينورمين Tenormin	<i>Atenolol</i>	لعلاج ارتفاع ضغط الدم ،لتخفيف آلام الذبحة الصدرية ويستخدم لتنظيم ضربات القلب وللرجفة .	لا يعطى في وذمة رئوية ، صدمة قلبية ، بطء القلب أو إحصار القلب ، يعطى بحذر في اختلال كبدي أو كلوي والمسنين ومرض رئوي وداء السكري (الحمل والإرضاع والأطفال لا يعطى)
ثايروكسين Thyroxin	<i>Levothyroxine sodium</i>	يستخدم لمرضى انخفاض عمل الغدة الدرقية والأورام الحميدة لهذه الغدة ، ويستخدم بحالة الأورام السرطانية للغدة الدرقية بعد خضوع المريض للجراحة .	لا يستعمل بحالة ارتفاع عمل الغدة الدرقية ، أمراض القلب ، وبحالة الحمل فلا بد من تغيير الجرعة لأنه تزداد الحاجة لهورمونات الغدة الدرقية
جابا تركس Gabatrex	<i>Gabapentin</i>	لعلاج آلام الاعتلال العصبي لدى البالغين ، كعلاج منفرد أو إضافي في الصرع .	لا يعطى في حالات الالتهاب الحاد في البنكرياس ، تخفيض الجرعة لدى المصابين في قصور وظائف الكلى ، الحمل والإرضاع للضرورة القصوى.
جكتوفر Jectofer انفيرون Inferon	<i>Iron – sorbitol</i>	في حالات فقر الدم	لا يعطى في داء ترسب الأصبغة الدموية الأولية ، فقر الدم الانحلالي وفقر الدم الأخرى لا ترجع إلى نقص الحديد ، يستخدم بحذر في القرحة الهضمية ، التهاب القولون التقرحي أو التهاب الأمعاء الإقليمية (يمكن أن تتفاقم الحالة) ، استخدام العشوائي المزمن (قد يؤدي إلى زيادة تركيز الحديد) ، المرضى المسنين ، الأطفال ، الرضاعة الحمل فئة B
جليماكس Glemax	<i>Glimepiride</i>	علاج داء السكري	في حالة القصور الكبدي او الكلوي ، لا يعطى للحوامل .
جوافلكس Guaflex	<i>Guava leaves + Tilia Flowers + Fennel oil</i>	لمعالجة السعال .	لا يوجد / آمن للحوامل والرضع والأطفال وكبار السن
دادكروم Dadcrome	<i>Sodium Cromoglycate</i>	علاج الاضطرابات البصرية ذات الطبيعة التحسسية ، وفي حالات التحسس الناتجة عن استعمال العدسات.	لا يستعمل للأطفال دون ٤ سنوات ، لا ينصح باستعمالها للحوامل والمرضعات إلا لضرورة ملحة.
دافستون Duphaston	<i>Dydrogesterone</i>	نقص البروجيستيرون مثل : آلام الطمث ، داء البطانة الرحمية ، انقطاع الطمث الثانوي ، عدم انتظام الدورة ، العقم ، الإجهاض المتكرر المصحوب بنقص البروجيستيرون .	ينصح بإيقاف الإرضاع أثناء اخذ العلاج ، يعطى للحوامل .

داونيكس Dawnex	Fluoxetine	علاج أشكال مختلفة من الاكتئاب ، الوسواس القهري ، اكتئاب المسنين	اختلال كبدي أو كلوي ، الوهن المرضي ، الحمل أو الرضاعة (وإن لم يثبت سلامة ، تم استخدامها بدون ضرر أثناء فترة الحمل
داونيل Daonil	Glibenclamide	علاج داء السكري	في حالة القصور الكبدي او الكلوي ، لا يعطى للحوامل
دايزل كيت Dazel kit	Fluconazole + Azithromycin + Secnidazole	للالتهابات الفطرية المهبيلية البسيطة والقوية	الحمل خاصة الأشهر الثلاث الأولى والمرضع .
دايلوزول Dilozole	Diloxanide furoate + Metronidazole – Benzoyl	علاج عدوى الاميبا في الأمعاء والأنسجة الأخرى وفي خارج الأمعاء وإصابات طفيلية أخرى .	يراعى تخفيض الجرعة في كبار السن والمرضى بقصور في وظائف الكبد ، لا يعطى أثناء الحمل في الأشهر الثلاثة الأولى وكذلك خلال الرضاعة والأطفال اقل من سنتين .
دربتاسير Drepettasir	Oxybutynin chloride	كمضاد تشنج للعضلات الملساء ، السلس البولي ، التبول اللاإرادي عند الأطفال ، اضطراب أو عسرة البول .	انسداد في الجهاز الهضمي ، وهن الأمعاء ، التهاب القولون ، الأمراض القلبية الوعائية ، الجلوكوما ، تجنب إعطاء الدواء للحوامل والمرضعات .
درمودين Dermodin	Clobetazol propionate in Anhydrous paraffin	التهابات الناتجة عن أمراض حساسية الجلد ، والحكة الجلدية ، الحرق ، الألم .	التهابات الجلد الفيروسية والبكتيرية ، جدري الماء ، الزهري ، تدرن الجلد ، حب الشباب ، يستعمل بحذر في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وكذلك الإرضاع .
درموكال Dermocal	Calamine + Glycerine + Camphor	يستعمل لحساسية الجلد ، لدغة الحشرات .	يعتبر مادة سامة لا يجوز تقريبه على العينين او الفم .
دسبتالين Duspatalin	Mebeverin HCL	اضطرابات القولون التشنجية ، آلام الأمعاء المرتبطة بأعراض القولون ، تهيج القولون .	لا يعطى للأطفال اقل من ٦ سنوات .
الدكتون Aldoctone	Spironolactone	علاج ارتفاع ضغط الدم ، تشمع الكبد ، إدارة فشل القلب الاحتقاني .	قصور كلوي حاد ، انحباس البول ، فرط بوتاسيوم الدم ، الحمل فئة (C)
دوبرجين Dopergin	Micronised Acid Lisuride + Micronised Tartaric acid + Micronised Sodium Calcium + Lactose + Magnesium Stearate + Microcrystalline Cellulose	لدى النساء: اضطراب حاد للعادة الشهرية ، العقم ، سيلان الحليب خارج الفترات الطبيعية للإرضاع . لدى الرجال : تضخم الثدي والعجز الجنسي . علاج مرض باركنسون .	اضطرابات نفسية ، اضطرابات حادة للدورة الدموية الشريانية ، ذبحة قلبية ، اختلال وظيفة الكلى أو غسل الكلى ، أثناء الحمل والإرضاع يفضل استشارة الطبيب .
دوسبين A Dospin-A	Clopidogrel Bisulfate + Atrovastatin + Aspirin	يعطى لتقليل الدهون في الدم ، بمنع تجمع الدم الصفائح	لا يعطى في حالة قلة تجمع الصفائح الدموية . أمراض الكبد ، خلال الحمل .
دوستنكس Dostinex	Cabergoline	يستعمل لعلاج عدم الاتزان في هرمون البرولاكتين عندما تزيد كمية البرولاكتين في الدم .	لا يعطى في حالات ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط ، يعطى بحذر في الاختلال الكلوي ، (الحمل فئة (B)

دوكسيدار Doxydar	<i>Doxycycline</i>	علاج حب الشباب ، علاج الجمرة الخبيثة ، علاج السيلان .	يعطى بحذر في اختلال كلوي أو كبدي الوهن المرضي الحمل فئة (D)
دولوزوكس Dolozox	<i>Diclofenac + Chlorzoxazone + Paracetamol</i>	يستخدم بحالة التشنجات العضلية القوية التي قد تصحبها حمى ، خافض حرارة	يستعمل بحذر بحالة أمراض الكبد والكلى ، الحامل والمرضع
الدوميت Aldomet	<i>Methyldopa</i>	علاج ارتفاع ضغط الدم .	يعطى بحذر للمرضى المسنين الحمل فئة (B)
دي - فوميت De-vomit	<i>Ondansetron HCL</i>	للوقاية والعلاج من الغثيان الذي تسببه المواد الكيميائية ، للوقاية والعلاج من الغثيان والاقياء بعد التدخلات الجراحية	يجب اخذ الحذر عند المرضى المصابين بقصور كبدي معتدل أو شديد أن لا يزيد الجرعة اليومية عن 8 ملغم الحمل فئة (B)
ديبوميديول Depo-medrol	<i>Methylprednisolone</i>	تستخدم في طائفة واسعة من الأمراض / التهابي ، الحساسية ، الأورام ، وحالات الربو .	يستخدم أقل جرعة ممكنة لأقصر فترة من الزمن في الحالات التالية : الأطفال الأمراض المزمنة الحمل فئة (C)
ديكادرون Decadron دكسون Dexon	<i>Dexamethasone</i>	في طائفة واسعة من الأمراض المزمنة بما في ذلك : التهابي ، الربو ، الحساسية ، الدموية ، الأورام .	يستخدم أقل جرعة ممكنة لأقصر فترة من الزمن في الحالات التالية : الأطفال الأمراض المزمنة (. الحمل فئة (C)
ديميكون Dimicone	<i>Dimethicone</i>	لمعالجة انتفاخ البطن ، لطراد الغازات والهواء من القناة الهضمية .	لا يوجد .
دينتي كورت Denti-cort	<i>Triamcinolone Acetonide</i>	مضاد للالتهاب ، الحكة ، الحساسية ، تقرحات الفم الناجمة عن الرضوض أو الجروح .	وجود عدوى جرثومية فطرية أو فيروسية في الفم أو البلعوم . لا يستعمل عند المصابين بالسل ، القرحة ، داء السكري ، أثناء الحمل إلا بعد استشارة الطبيب .
رابيزول Rabazole	<i>Rabeprazole</i>	علاج قرحة الاثني عشر والمعدة ، علاج التهاب المرىء الارتجاعي ، التهاب وقرحة الجهاز الهضمي .	يجب اخذ الحذر مع المرضى المصابين بقصور حاد في وظائف الكبد ، لا يعطى للحوامل والمرضعات
الريمين Allermine	<i>Diphenhydramine HCL</i>	مضاد للحساسية .	لا يستعمل في نوبات الربو الحادة ، الإرضاع ، يستعمل بحذر في أمراض الكبد ، المسنين ، الحمل فئة (B)
رواتينكس Rowatinex	<i>Pinene + Camphene + Borneol + Anethol + Fenchone + Cineol + Olive oil</i>	لعلاج المغص الكلوي ، وعلاج الالتهاب المرافق للحصى الكلوي ، ويساعد على تذويب وطراد الحصى .	عدم الاستعمال في حالات المغص الشديد وحصر البول ، لا يستعمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل .

روفاسين Rovacin	Spiramycin	التهاب القصبات ، ذات الرئة ، التهاب الحنجرة ، التهاب الجيوب ، التهاب اللثة ، التهاب البلعوم ، التهاب الأذن الوسطى ، داء المقوسات ، الوقاية من داء المقوسات الخلقي أثناء الحمل .	يستعمل بحذر عند المرضى المصابين بأمراض كبدية أو قصور كبدي ، اضطراب في نظم القلب .
ريابال Riabal	Prifinium bromide + Paracetamol	آلام تقلصات القناة الهضمية وزيادة حركتها ، التهاب المعدة ، التهاب الأمعاء والقولون ، القرحة الهضمية ، آلام تقلصات الصفراء ، تقلص المجرى البولي ، التهاب البنكرياس	في حالات الجلوكوما ، وتضخم البروستات .
ريتـن A Retin A ريتـنويد Retinoid	Tretinoin	كمادة مضادة لتقرن الجلد ، لمعالجة حب الشباب ، وفي إزالة تجاعيد الوجه والكلف والحزاز المسطح وحالات الاكزيما .	لا يستخدم مع أي علاج جلدي آخر ، لا يطبق على الأغشية المخاطية والجروح ، لا يستخدم أثناء الحمل .
ريسـدال Risdal	Risperidone	علاج الفصام والاضطرابات العقلية الأخرى .	يعطى بحذر في حالات قصور بوظائف الكبد أو الكلى ، وفي أمراض القلب والأوعية الدموية ، الصرع ، خلال الحمل والإرضاع للضرورة القصوى.
ريفادين Rifadin	Rifampicin	إدارة السل النشط (بالاشتراك مع عوامل أخرى) ، القضاء على ناقل لمرض التهاب السحايا .	يعطى بحذر للأمراض الكبد ، الرضاعة ، (الحمل فئة . C)
زنتاك Zantac	Ranitidine	قرحة الاثنى عشر ، فرط إفراز المعدة ، القرحة المعوية الحميدة ، عسر الهضم ، فرط الحموضة .	يعطى بحذر في حالات اختلال كلوي ، المرضى المسنين ، وفي الحمل والإرضاع .
زنتال Zental	Albendazole	طارد للديدان ، علاج مرض الاكياس المائية و إصابة الدماغ بيرقات الديدان الشريطية .	يستخدم بحذر أثناء الإرضاع ، وفي حالات اضطرابات وظيفة الكبد ، لا يستخدم أثناء الحمل .
زولام Zolam	Alprazolam	حالات القلق ، حالات الاكتئاب ، اضطرابات ناتجة عن الخوف ، علاج رعاش الحركة الأساسي .	لا يعطى في حالات القصور التنفسي الحادة ، لا يعطى في الحمل والإرضاع يعطى بحذر في القصور الكبدي أو الكلوي
زولامول Xolamol	Dorzolamide hydrochloride + Timolol maleate	لخفض الضغط المرتفع داخل العين للمرضى الذين يعانون من الجلوكوما مفتوحة الزاوية	الربو الشعبي ، مرض انسداد الرئة ، بطن القلب ، قصور القلب . الصدمة القلبية ، لا ينصح في الحمل والرضاعة

اضطراب في وظيفة الكلية والكبد ، يستعمل للضرورة أثناء الحمل والإرضاع .	معالجة ارتفاع حمض البول ، اعتلال الكلية اليوراتي ، داء الليشمانيات ، داء الملوك .	<i>Allopurinol</i>	زيلوريك Hypuric اللوريك
لا يعطى خلال الحمل والإرضاع .	علاج سرطان الثدي بعد الجراحة والأشعة ، معالجة مرافقة لسرطان الثدي المتقدم .	<i>Tamoxifen citrate</i>	زيموبليكس Zymoplex
القصور الكلوي أو الكبدي ، يعطى بحذر للمصابين بضخامة البروستات ، صعوبة بالتبول .	السعال بكافة أنواعه ، الحالات التحسسية التي تصيب الجهاز التنفسي و مقشع .	<i>Diphenhydramine HCL + Ammonium chloride + Sodium Citrate + Menthol</i>	ساملين Samilin
يحظر لمن لديهم اضطرابات في الأوعية الدموية المحيطية ، داء القلب التاجي ، فرط ضغط الدم ، الحمل والإرضاع ، حالات قصور الكبد والكلية	لمعالجة الشقيقة الحادة كما يستعمل لمعالجة أنواع أخرى من الصداع .	<i>Ergotamine tartrate + Caffeine</i>	ساندو ميغرين Sandu Migrain آسيا ميغرين Asia Migrain
يجب تجنب اعطاء عدد كبير من القطرات وخاصة الاطفال اقل من سنة.	في حالات المغص والتقلصات عند الأطفال	<i>Piperizolate methyl bromide + Phenobarbitone</i>	سباستال Spastal
يستعمل بحذر في حالة الصرع ، الوهن العضلي . لا يستعمل في حالات : الطفل في طور النمو ، الحمل والإرضاع .	التهاب البروستات ، التهاب العظام والمفاصل والجلد ، التهابات المجاري البولية .	<i>Ciprofloxacin</i>	سيرودار Ciprodar
لا ينصح بإعطائه للحوامل بدون استشارة الطبيب ، عند المصابين بهبوط التوتر الشرياني .	معالجة اضطرابات الدورانية الدماغية اضطرابات التوازن ، معالجة الشقيقة.	<i>Cinnarizine</i>	ستاجيرون Stugeron
يجب تجنبه في حالة المرضى الذين يعانون من تضخم البروستات .	حالات تهيج القولون	<i>Isoprampamide + Trifluoperazine</i>	ستلابيد Stelabid
لا يعطى في أمراض الكبد ، أمراض القلب والأوعية الدموية ، الجلوكوما ، يعطى ، بحذر في داء السكري ، أمراض الجهاز التنفسي ، تضخم البروستات ، أورام الجهاز العصبي المركزي ، صرع ، انسداد معوي ، (الحمل فئة . C)	علاج الذهان الحاد والمزمن ، مساعد في إدارة القلق .	<i>Trifluoperazine HCL</i>	ستلازين Iralzine
يجب إنقاص الجرعة للمرضى المصابين بخلل كلوي شديد ، يجب اخذ الحذر عند استعماله لحديثي الولادة المصابين باليرقان ، يجب اخذ الحذر عند استعماله للنساء الحوامل والمرضعات ، يجب عدم الاستعمال مع المحاليل المحتوية على الكالسيوم حيث يتسبب ذلك في حدوث آثار جانبية مميتة .	التهابات الجهاز التنفسي ، التهابات الجلد ، التهابات المسالك البولية ، داء السيلان ، تسمم الدم الجرثومي ، التهابات أغشية البطن ، التهابات العظم والمفاصل ، التهاب السحايا .	<i>Ceftriaxone</i>	سفترايكون Ceftriaxone
يعطى بحذر في قرحة المعدة ، ينصح بعدم استعماله خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، أما خلال الإرضاع للضرورة فقط .	مقشع ومذيب للإفرازات ، تخفيف الأعراض المصاحبة للالتهابات القصبية الشعبية	<i>Bromhexin HCL</i>	سلفودين Solvedin

سليستون Celestone	Betamethason	في طائفة واسعة من الأمراض المزمنة بما في ذلك : التهابي ، الحساسية ، الدموية ، الأورام ، اضطرابات المناعة الذاتية	لا يعطى للأطفال ، يعطى أقل جرعة واقصر وقت في الحالات الآتية : أصحاب الأمراض المزمنة ، الإجهاد (الجراحة ، التهابات) ، (في الحمل) لم يثبت سلامة).
سمفور Simvor سيمفاتين Simvatin	Simvastatin	ارتفاع الكوليسترول في الدم وخلل دهون الدم المختلط ، ارتفاع الدهون في الدم .	لا يعطى في أمراض الكبد أو الارتفاع غير المبرر لإنزيمات الكبد ، لا يعطى للنساء الحوامل والمرضعات .
سوبر جيسيك Super gesic	Paracetamol + Diclofenac Potassium	عسر الطمث ، حالات الألم المفاجئة ، حالات الالتهاب الخمجي ، ألم الأسنان ، حالات الألم والحرارة المترافقة مع الالتهاب	يحظر استعمال في الأشهر الأخيرة للحمل ، يجب أخذ الحذر عند الإرضاع ، كذلك يستخدم بحذر في المرضى المصابين باحتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم والقصور القلبي
سوبراكس Suprax	Cefixime	التهاب البلعوم ، التهاب اللوزتين ، التهاب الجيوب ، التهاب القصبات ، التهاب الأذن الوسطى ، التهابات المجاري البولية	يجب تعديل الجرعة لدى مرضى اعتلال الوظيفة الكلوية ، يجب مراقبة المرضى الخاضعين للديال باهتمام ، (الحمل فئة B)
سيدامكس Cidamex	Acetazolamide	الجلوكوما ، علاج ثانوي لبعض نوبات الصرع ، علاج مساعد في حالات الاوديما الناتجة عن هبوط القلب الاحتقاني أو عن بعض الأدوية	انخفاض نسبة البوتاسيوم أو الصوديوم في الدم ، القصور الكلوي أو الكبدي أو قصور الغدة الدرقية ، توخي الحذر أثناء الحمل والإرضاع
سيدو بكت sedo-pect	Diphenhydramine HCL + Sodium Citrate + Codeine phosphate + Menthol	علاج السعال الجاف والمعند والمتهيج.	لا يعطى للحوامل .
سيديلار Sedilar	Dextromethorphan HBr	أعراض تخفيف من السعال التي تسببها فيروسات طفيفة ، التهابات الجهاز التنفسي العلوي ، السعال المزمن	يستخدم بحذر عند مرضى السكري ، والإرضاع ، يستخدم بأمان عند الحمل
سيلافكس Celavex	Cetimid	يستعمل للجروح والحروق والتقرحات الجلدية .	يستعمل بأمان
سيليكس Celex	Celecoxib	لتخفيف أعراض وعلامات الالتهاب العظمي المفصلي .	لا يعطى للمرضى المصابين بالربو أو الارتكاس التحسسي ، لا يعطى للمرضى المصابين سابقا بقرحة أو نزف هضمي ، لا يعطى للأطفال دون سن ١٨ سنة ، كما لا ينصح للمرضعات ولا يعطى للحوامل وخاصة الأشهر الأخيرة من الحمل .
سينامت Sinemet	Carbidopa + Levodopa	لمعالجة أعراض داء باركنسون .	لا يعطى في الجلوكوما ، إصابة بأفات جلدية ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع .

سيودافيد بلص Sudafed plus	Paracetamol + Tramadol + Diclofenac	مسكن للألام العضلي / المفاصل الصداع / الأسنان ، التشنج العضلي.	يعطى بحذر في أمراض الجهاز التنفسي ، في الحمل والإرضاع ، أمراض القلب ، ارتفاع ضغط الدم ، الغدة الدرقية ، داء السكر ، القرحة انسداد الأمعاء .
فالوبين Valopin ديباكين Depaken	Valproate sodium	لعلاج جميع أشكال الصرع .	لا يعطى في حالات مرض كبدى شديد ، البورفيريا ، يعطى للحوامل للضرورة فقط
فالسيوم Valium	Diazepam	مهدئ حالات الهستريا والتشنج ، ارتخاء العضلات ، القلق .	يعطى بحذر للمرضى الذين لديهم خلل في وظائف الكبد ، اختلال كلوي حاد المسنين أو المرضى بالوهن والأطفال (الحمل فئة D)
فايلوكونتين Phyllocontin	Aminophylline	حالات ضيق التنفس والربو انسداد مجرى الهواء الناجم عن انعكاس أو الربو المزمن .	عدم انتظام ضربات القلب غير المنضبط ، فرط الدرقية . يعطى بحذر للمرضى المسنين فوق ٦٠ سنة ، الحمل فئة C)
فلاجيل Flagyl	Metronidazole	داء الأميبة المعوي والكبدى ، إسهال ، وفي الإصابة بالجراثيم اللاهوائية ، داء الجيراديات .	يستعمل بحذر كبير عند المرضى المصابين باضطرابات دموية أو أمراض فعالة في الجملة العصبية ، لا يعطى في الحمل والإرضاع .
فلدين Feldene	Piroxicam	حالات متعددة التي تتطلب تأثير مضاد للالتهابات/أو تأثير مسكن ، التهاب المفاصل ، هشاشة العظام	لا يعطى في حالة القرحة ، ولا يعطى في الإرضاع ، يعطى بحذر في أمراض القلب ، الاختلال الكلوي ، الحمل والأطفال لم تثبت السلامة
فلوكا Fluca	Sodium cromoglicate + Fluorometholone	معالجة التهابات الجفن وبصلة الملحمة وقرنية العين الجزء الأمامي من الكرة .	لا يستعمل لمعالجة التهابات القرنية الناجمة عن الهريز سملكس السطحي ، تدرن العين ، لا ينصح في الحمل.
فلوكس Fluex فوركان Forcan	Fluconazole	معالجة العدوى الفطرية التي تسببها الكائنات الحساسة ، بما في ذلك : الفم والبلعوم أو المريء ، المبيضات ، التهابات المسالك البولية ، التهاب الصفاف ، التهاب السحايا المستشفيات الوقاية من داء المبيضات .	يعطى بحذر في حالات أمراض الكبد أو الكلية ، لا يعطى للأطفال وخلال الإرضاع والحمل .
فلوميزين Floumizin همازين Hmazzin	Silvers Sulphadiazine	لمعالجة الحروق والتقرحات الجلدية .	لا يستعمل للرضع في الأشهر الأولى من الولادة ، الخدج ، لا يستعمل أثناء الحمل .
فورادون Furadon	Furazolidone	التهابات الأمعاء والإسهال الجرثومي أو الطفيلية .	لا يستعمل للرضع دون شهر واحد ، لا ينصح خلال الحمل والإرضاع .
فوزماكس Fosamax اوستي Oste	Alendronate	العلاج والوقاية من مرض هشاشة العظام في النساء بعد سن اليأس ، علاج ترقق العظام لدى الرجال ، علاج مرض باجيت للعظام .	لا يعطى في حالات قصور الكلوي ، الحمل والإرضاع .

يستعمل في الحمل والإرضاع للضرورة فقط .	الالتهابات الجلدية ، تطهير البثور الجرثومية وفي حالات الإصابة بالدمل والحروق والجروح .	<i>Fusidate Sodium</i>	فوسين Fucine فيوسيدين Fucidin
لا يعطى مع المسكنات الأخرى ، بما فيها الأسبرين ، حالات القرحة ، الحمل الفئة B ، في الثلث الأول	مسكن للألام وخافض للحرارة والتهاب المفاصل والنقرس ، هشاشة العظام	<i>Diclofenac Sod.</i>	فولتارين Voltaren
يستعمل بأمان لكن يجب تجنب فرط الجرعة	لتكوين الحمض النووي ومضاد للأنيميا الخبيثة	<i>Cyanocobalamine</i>	فيتامين B12 Vitamin B12
يستعمل بأمان لكن يجب تجنب فرط الجرعة	يساعد الجسم على استعمال الأحماض الامينية التي تعتبر قوالب بناء البروتينات	<i>Pyridoxine</i>	فيتامين B6 Vitamin B6
لا يوجد .	مرهم جلدي مطهر للقروح والجروح والحروق	<i>Povidone Iodine</i>	فيدون Vidone
(الحمل فئة . B)	علاج الالتهاب الفيروسي	<i>Acyclovir</i>	فيراميد Veramed زوفيراكس Zovirax
لا يستعمل في حالات الدرن الحاد ، قرحة المعدة والاثني عشر ومرض السكر وترقق العظام .	الربو الشعبي ، الارتكاريا ، حالات الحساسية الأخرى ، الحمى الروماتيزمية الحادة .	<i>Dexamethasone + Chlorpheniramine</i>	فينادون Phenadone
اخذ الحذر عند الاستعمال لدى المرضى الذين يعانون من اضطراب في وظائف الكلية ، فرط بوتاسيوم الدم كذلك الذين يعانون من تضيق في الشريان الابهر ، يستخدم عند الأطفال في حال عدم جدوى الطرق الأخرى الخافضة للضغط (الحمل فئة . C)	علاج لارتفاع ضغط الدم ، معالجة قصور القلب الاحتقاني .	<i>Captopril</i>	كابوتين Capoten
أثناء الحمل يستعمل فقط للضرورة القصوى وحسب الاحتياج .	طارد للديدان.	<i>Levamisole</i>	كاتركس Katrex
لا يستعمل للحوامل والمرضعات .	أعراض تضخم البروستات الحميد ، ارتفاع ضغط الدم الخفيف أو المعتدل.	<i>Doxazosin mesylate</i>	كاردوسير Cardosyr
لا يعطى في الرجفان البطيني الليفي ، يعطى بحذر في قصور وظائف الكلى ، وحالات خلل الغدة الدرقية . يعطى في الحمل والإرضاع للضرورة القصوى.	حالات فشل القلب و الرجفان الأذيني الليفي	<i>Digoxin</i>	كارديكسين Cardixin
لا يعطى في حالات الصدمة القلبية ، ببطء كبير في نبضات القلب ، عجز في وظيفة الكبد ، الانحصار الأذيني البطيني من الدرجة الثانية والثالثة ، الأطفال دون ١٨ سنة ، (الحمل فئة . C)	يستخدم في فرط ضغط الدم ، الذبحة الصدرية ، قصور عضلة القلب المزمن	<i>Carvedilol</i>	كارفيرييس Carvipress
لا يوجد .	الانتفاخ ، المغص الناتج عن الانتفاخ بسبب الغازات ، طارد للغازات	<i>Cinnamon oil + Caraway oil + Fennel oil</i>	كارمينكس Carminex

لا يستعمل في حالات القصور الكلوي الشديد ، الرضع وحديثي الولادة الحمل فئة . C	المعالجة العرضية لفرط الحموضة ، المعالجة العرضية لعسر الهضم وحرقة الفؤاد .	<i>Mg. trisilicate + Al. hydroxide gel</i>	كاستروجيل Gastrogel انتي أسيد anti acid
يجب اخذ الحذر في حالة أمراض الكبد لا يعطى في الحمل والإرضاع والأطفال دون ١٨ سنة إلا للضرورة القصوى .	التهابات المعدة والاثني عشر والقرحة والحرقة .	<i>Omeprazole</i>	كاسك Gasec اومبرازول Omeprazole
آلام حادة في البطن لسبب غير معروف وخصوصا عندما يرتبط مع حمى ، الأطفال اقل من ٣ سنوات الحمل فئة . C	مضاد للإسهال .	<i>Kaolin + Pectin</i>	كاو - بكتين Kao- pectin بكتوكال Pectokal
تجنبها في المرضى الذين يعانون من التعصب ، في حديثي الولادة ، يعطى بحذر ضعف السمع ، والأطفال الخدج ، السمنة المرضى . / الرضاعة ، والرضع وحديثي الولادة (لم يثبت سلامة) الحمل فئة . C	علاج الالتهابات الجرام سلبية خطيرة العصوي والالتهابات التي تسببها العنقوديات عند موانع بنسليات أو غيرها من المخدرات أقل سمية	<i>Gentamycin</i>	كراميسين Garamycin جندين Genidin
لا ستعمل في الحالات الجلدية الالتهابية الحادة .	مضاد للحكة (كافة أنواع الحكة) ، وفي الجرب .	<i>Crotamiton</i>	كروتاميتون Crotamiton
بالنسبة للحمل فئة B ، يجب توخي الحذر عند الإعطاء للام المرضعة .	التهاب المسالك البولية / التهاب الجلد / التهاب الحلق واللوزتين .	<i>Cefadroxil</i>	كفديل Kefdil
في حالة الفشل الكلوي يجب أن تحدد الجرعة بدقة ، (الحمل فئة . B	التهاب الجهاز التنفسي ، التهاب اللوزتين ، التهاب الجيوب الأنفية ، التهاب الأذن الوسطى ، التهاب المسالك البولية والتناسلية ، التهاب البروستات ، التهاب الجلد والأنسجة .	<i>Cephalexin</i>	كفلكس Keflex
يعطى بحذر لدى المرضى المصابين بأمراض في الجهاز الهضمي ، في الحمل والإرضاع للضرورة فقط .	التهابات الجهاز التنفسي السفلي ، الالتهابات البولية والتناسلية ، الالتهابات النسائية ، تجرثم الدم ، التهابات الجلد والأنسجة ، التهابات داخل البطن ، التهابات العظم والمفاصل ، السحايا .	<i>Cefotaxime</i>	كلافوران Claforan
أمراض الكبد ، سرطان البطانة الرحمية ، الكيسات المبيضية الحمل والإرضاع .	في معالجة العقم الناجم عن غياب الإباضة أو خلل الإباضة .	<i>Clomiphen Citrate</i>	كلاميد Clomid كلوميدين Clomidine
يجب عدم الاستخدام في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ما لم يرى الطبيب ضرورة لذلك .	مضاد ومبيد فطري واسع الطيف وقاتل للوحيدات المشعرة .	<i>Clotrimazole</i>	كلوتريمازول Clotrimazole كاندي مازول Candi mazol
لا يستعمل في حالات القصور الكلوي أو الكبدي ، وحدث جفاف ، قصور القلب ، ولا يستعمل أثناء الحمل .	علاج داء السكر ، وكعلاج مساعد لمرضى داء السكري المعتمدين على الأنسولين .	<i>Metformine</i>	كلوكوفج Glucophage

كلونا – ريل Clona – ril	Clonazepam	يستعمل لكل أنواع الصرع والنوبات الصرعية التي تحدث للرضع والأطفال والبالغين	قصور رئوي حاد ، تثبيط تنفسي ، تجنب الاستعمال أثناء الحمل والإرضاع .
كوادريديرم Quadriderm بولي ديرم Polyderm تتراديرم Tetraderm	Betamethasone + Gentamicin + Clioquinol + Tolnaftate	لمعالجة الالتهابات الجلدية والفطرية والحكة والتحسس الجلدي .	لا يستعمل في الحالات : تدرن الجلد ، الإصابات الجلدية الإفرنجية ، والاختلاج الفيروسي في الجلد ، يستعمل أثناء الحمل والإرضاع للضرورة فقط.
كوردارون Cordarone	Amiodarone HCL	للوقاية من بعض أنواع الاضطرابات في نظم القلب ومعالجتها .	لا يعطى في فرط الغدة الدرقية ، بطء القلب ، يجب إخبار طبيب التخدير في حال استعمال هذا العلاج قبل العملية الجراحية ، لا يعطى بعد الشهر الرابع من الحمل .
كولد – أيد Cold – Aid	Chlorpheniramine maleate + D-pseudoephedrine HCL	إزالة الاحتقان الأنفي والحساسية ، وقف سيلان الأنف والأعراض المترافقة ، احتقان الأغشية المخاطية ، احتقان الجيوب والمساعدة على فتحها.	وجود إصابة بالشرابين الإكليلية ، فرط نشاط الغدة الدرقية ، الجلوكوما ، تضخم البروستات ، انسداد المثانة ، الأطفال أقل من ١٢ سنة ، الحمل والإرضاع .
كولدين Coldin	Paracetamol + Pseudo-Ephedrine + Chlorpheniramine maleate + Vitamine C	تخفيف أعراض احتقان وسيلان الأنف والعطس والالام الخفيفة والصداع والحمى التي يسببها الرشح العادي وحمى القش والتحسسات الأنفية	عدم الإعطاء للمرضى المصابين بأمراض كلوية أو كبدية إلا بعد استشارة الطبيب .
كيتوتيفين Ketotiphen	Ketotiphen	الربو القصبي ، التهاب القصبات التحسسي ، أعراض الربو المترافقة مع حمى الطلع .	لا يعطى للحوامل والمرضعات إلا للضرورة ، كما يتوجب الانتباه إلى عدد الصفحات الدموية عند المرضى الذين يتعاطون بنفس الوقت المواد المضادة للسكري .
كيميدال Kimidal	Scopolamine methonitrate	التشنج والمغص المعدي المعوي ، الاقياء والغثيان	يجب اخذ الحذر لدى المصابين بقصور كلوي أو كبدي أو الصرع .
كينالوغ Kenalog	Triamciolone Acetonide	معجون لمعالجة تقرحات الفم .	ينصح بعدم الاستعمال عند وجود إصابات فطرية أو حمى راشحة أو آفات جرثومية في الفم والحلق .
لارجكتيل Largactil	Chlorpromazine HCL	يستعمل في بعض اضطرابات المزاج ، الفواق العنيد ، الغثيان والقيء .	الجلوكوما ، خطر الاحتباس البولي ، أمراض القلب والشرابين ، أمراض الكبد ، يستخدم بحذر في مرض السكري ، أمراض الجهاز التنفسي تضخم البروستات ، أورام الجهاز العصبي المركزي ، صرع ، انسداد معوي ، في الحمل أو الإرضاع : لم تثبت السلامة

يعطى بحذر في حالات أمراض الكبد ، داء السكري ، الأطفال دون ١٨ سنة ، الحمل فئة (C)	مدر للبول عند ارتفاع ضغط الدم .	<i>Furosemide</i>	لازكس Lasix
مرضى الغالاكتوزيما ، حالات الانسداد المعوي ، عدم تحمل لاكتولوز ، يستعمل بأمان خلال الحمل .	لمعالجة الإمساك ، مرضى اعتلال الدماغ الكبدى .	<i>Lactulose</i>	لاكتولاك Lactolac
لا يعطى في حالات وجود ألم بطني حاد ، التهاب زائدة ، نزف شرجي ، التهاب المعدة والأمعاء ، انسداد معوي الحمل فئة (B)	لمعالجة الإمساك .	<i>Bisacodyl</i>	لاكسدل Laxadyl بسكوديل Bisacodyl
يجب اخذ الحذر في حالة أمراض الكبد لا يعطى في الحمل والإرضاع والأطفال دون ١٨ سنة إلا للضرورة القصوى .	التهابات المعدة والاثني عشر والقرحة والحرقة .	<i>Lansoprazole</i>	لانسيد Lancid
لا يوجد .	ترطيب أغشية الأنف الجافة في حالة التهاب الجيوب الأنفية ، تعرض للجفاف واستخدام الأوكسجين .	<i>Sodium chloride + Sodium bicarbonate</i>	لايس Lyse
يعطى بحذر في الجلوكوما ، ارتفاع ضغط الدم الوهن العضلي ، التهاب القولون التقرحي ، أمراض الكبد والكلى والرئتين ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع .	يمنع تقلصات عضلات جدار الأمعاء ، تخفيف من إنتاج حمض المعدة .	<i>Chlordiazepoxide + Clinidium bromide</i>	لبراكس Librax
الانتفاخ البطني ، داء الأمعاء الالتهابي الحاد ، لا ينصح للرضع ، التهاب القولون المرافق للمضادات الحيوية .	مضاد للإسهال .	<i>Loperamide HCL</i>	لوبرمايد Loperamide
يعطى بحذر في الحمل والإرضاع .	شراب مخفف للسعال و مقشع ومذيب للإفرازات .	<i>Dried ivy leaf extract + Potassium sorbate</i>	ليبلاب Liblab
لا يعطى في حالات الصدمة القلبية ، قصور القلب ، حصار القلب ، بطء القلب الجيبي ، يعطى بحذر للحوامل والمرضعات وتحت إشراف الطبيب .	الذبحة الصدرية ، ارتفاع الضغط الشرياني ، للوقاية من الشقيقة ، وكعلاج مساعد في فرط نشاط الغدة الدرقية .	<i>Metoprolol</i>	لوبريس Lopress
لا يعطى للأشخاص الذين لديهم احتباس البول ، لا يعطى للحوامل والمرضعات	معالجة ارتفاع الضغط الحاد .	<i>Losartan Potassium + Hydrochlorothiazide</i>	لوتيد Lotid
لا يعطى للحوامل ، من باب الاحتياط لا يعطى أثناء الإرضاع وفي حالة القصور الكبدى والكلوي .	التهاب الأنف التحسسي ، التهاب الملتحمة ، الاضطرابات التحسسية الجلدية .	<i>Loratadine</i>	لوراتادين Loratadine لورتين Lortin
يعطى بحذر لمرضى القصور الكبدى والكلوي ، بالنسبة للإرضاع يجب إيقاف العلاج أو الإرضاع حسب أهمية العلاج للأم ، لا يعطى للحوامل وخاصة بعد الأشهر الثلاثة الأولى .	علاج ارتفاع التوتر الشرياني (علاج ضغط الدم) يستعمل لوحده أو بالمشاركة مع خافضات الضغط الأخرى .	<i>Losartan potassium</i>	لوزارتان Losartan
التهاب القرنية الناتج من هربس سميلكس ، التهاب الملتحمة والقرنية : فاكسينا ، فاركسيل / التهابات الفطرية .	لعلاج التهابات ملتحمة العين والقرنية الجزء الأمامي من العين .	<i>Ofloxacin + Prednisolone acetate + Tetrahydrozolin HCL</i>	لوكسترا Loxtr

ليورسال Lioresal	Baclofen	معالجة التشنج ، علاج التشنج الشديد الناشئة في الحبل الشوكي ، إدارة الألم في التهاب العصب الثالث .	يعطى بحذر في المرضى الذين يعانون من الصرع ، المسنين ، مرضى اختلال كلوي ، والرضاعة ، والأطفال (الحمل فئة . C)
ماء غريب Gripe Water	Dill seed oil + Sodium bicarbonate	تخفيف آلام المغص ، تخفيف الحموضة والنفخة عند الأطفال .	لا يوجد .
ماكسبين Maxipen	Amoxicillin + Flucloxacillin	التهاب الجهاز التنفسي ، التهاب اللوزتين ، التهاب الجيوب الأنفية ، التهاب الأذن الوسطى ، التهاب المسالك البولية والتناسلية ، التهاب البروستات ، التهاب الجلد والأنسجة ، خراجات داخل البطن ، خراج الرئة .	ينقص الاموكسيسيلين من فعالية مانعات الحمل الفموية . (الحمل فئة . B)
مايكوهيل Mycosheel	Miconazole Nitrate	لعلاج التهابات الفطرية وكذلك الالتهاب الثانوي الناتج عن البكتريا .	يجب الحذر عند الإعطاء للام المرضعة ، لا ينصح باستعماله للمرأة الحامل في الأشهر الثلاثة الأولى .
مايوجيسك Myogesic كاناجيسك Kanagesic	Orphenadrine citrate + Paracetamol	الآلام الخفيفة والمتوسطة كحالات اضطراب العضلات ، آلام أسفل الظهر ، انزلاق الغضروف ، آلام المفاصل ، الصداع ، آلام عسر الطمث .	لا يعطى في الجلوكوما ، انحباس البول ، الوهن العضلي ، لا يعطى للأطفال دون ١٠ سنة ، يعطى بحذر للمرضى الذين يعانون من خفقان القلب ، يعطى بحذر في الحمل والإرضاع .
مثيريم Methoprim	Trimethoprim + Sulfamethoxazole	إصابات السبيل البولي ، التهاب القصبات المزمن ، التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال ، الإسهال .	الفشل الكلوي أو الكبدي الشديد ، البرفيرية الحادة ، الرضع بعمر أقل من شهرين ، الحمل ، يستعمل بحذر عند المرضى الكهول .
مثرجين Methergin اركوت Ergot	Methyl ergmetrine	في حالات النزوف النسائية ، الوقاية من النزف الرحمي بعد الولادة	لا يجوز الاستعمال في اضطراب الوظيفة الكبدية والكلى ، ولا يجوز أثناء الحمل .
موبك Mobic	Meloxicam	لعلاج أعراض الالتهابات الروثوية ، لعلاج أعراض الالتهاب العظمي المؤلم (داء المفاصل ، الداء المفصلي التنكسي)	لا يستعمل في القرحة الهضمية ، القصور الكبدي الحاد والقصور الكلوي الشديد ، الأطفال والمراهقين دون ١٥ سنة ، وكذلك أثناء الحمل والإرضاع .
موتالون Motilium دومبي Dompy	Domperidone	معالجة أعراض الغثيان والقيء وحالات عسر الهضم .	نزف المعدة والأمعاء ، انسداد أو ثقب في الجهاز الهضمي ، ينصح باستشارة الطبيب أثناء الحمل ، لا يستخدم أثناء الإرضاع .
موديوريتك Moduretic	Amiloride Hydrochloride + Hydrochlorothiazide	مدر للبول في حال ارتفاع ضغط الدم ، في حالات تليف الكبد المصحوب باستسقاء .	خلل في وظائف الكلى ، ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم ، في حالات تعاطي أدوية تحتوي على البوتاسيوم ، لا يعطى في الحمل والإرضاع

ميزاكول Mesacol	Mesalazine	معالجة امراض القولون القرحية الحادة والوقاية من الاندفاعات النزفية المتطورة بدءاً من القولون حتى الشرج	لا يعطى لمرضى القصور الكبدي او الكلي ، لا يعطى خلال الحمل ، يعطى بحذر اثناء الارضاع وكذلك لكبار السن
نابروكس Naprox	Naproxen	مسكن الم ، للحمى ، عسر الطمث ، التهاب المفاصل الروماتزم ، هشاشة العظام .	لا يعطى في حالات القرحة ، يعطى بحذر في حالات امراض القلب الوعائية والكلية والكبدية والحمل والرضاعة أو الأطفال اقل من ٢ سنة.
نازوفرين Nazophrine	Naphthazoline nit. + Phenylephrine HCL + Chlorbutol	يعطى في حالة انسداد الانف	الاستعمال المطول لهذه القطرات يؤدي الى احداث اذى كبير للاغشية المخاطية مما يؤدي الى انسداد الانف .
نكرام Nigram	Nalidixic acid	معالجة التهابات الجهاز البولي السفلي ، معالجة الزحار العصوي ، إسهال	لا يعطى للرضع دون الثلاثة أشهر ، والحوامل ، وخلال الإرضاع ، يعطى بحذر للمرضى المصابين بقصور في وظائف الكلية أو الكبد .
نورفلوكس Norflox	Norfloxacin	التهابات الكلية والمجاري البولية ، التهابات الجهاز الهضمي الاسهالات ، السيلان ، التهاب الصفاق	يعطى بحذر في الاعتلال الكلوي والكبدى الشديدين ، الصرع واضطرابات الجملة العصبية المركزية وعند كبار السن ، لا يستعمل عند الأطفال والمرضعات الحوامل
نوفادوكس Novadoxe	Meclozine HCL + Vitamin B6	الدوخة والاقياء الناتج عن الحمل .	يستخدم بحذر عند مرضى الربو أو الجلوكوما أو توسع غدة البروستات ، لا ينصح للأطفال دون ١٢ سنة ، الحمل فئة . B
نوفافين Novafen	Paracetamol + Ibuprofen + Caffeine	مسكن للآلام وخافض لحرارة	لا يعطى في : قرحة المعدة. يعطى بحذر في الربو ، أمراض المعدة ، فشل الكبد والكلى ، أمراض القلب عجز القلب ، ارتفاع ضغط الدم ، الحمل خاصة الأشهر الثلاثة الأخيرة .
نيساتين Nystatin	Nystatin	الأمراض المسببة بالفطور الخميرية ، داء المبيضات الذي يصيب الأغشية المخاطية ، يستعمل لمنع تطور داء المبيضات خلال المعالجة الطويلة بالمضادات الحيوية	يعطى بحذر لمرضى السكري الحمل فئة . B
نيستاغرام Nystagram	Triamcinolone acetoneide + Gramicidin + Neomycin + Nystatin	مضاد جرثومي ، مضاد فطري مضاد للالتهابات واسع الطيف .	لا يستعمل عند وجود التهابات فيروسية موضعية أو جهازية ، لا يستعمل خلال الحمل ، يعطى بحذر للأم المرضعة .
نستاكورت Nystacort			

يعطى بحذر في القصور الكبدي أو الكلوي أو القصور التنفسي . لا يعطى في فقدان الوعي ، فرط التوتر داخل القحف ، الأطفال ، الصرع ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصوى .	مسكن مركزي قوي يستعمل لتسكين الآلام المتوسطة أو الشديدة	<i>Tramadol HCL</i>	نيودول Neodol
لا يعطى في حالة انسداد الشريان التاجي ، احتشاء العضلة القلبية ، يمكن استعماله للحوامل .	لعلاج ارتفاع ضغط الدم	<i>Amlodipine + Lisinopril</i>	هبريل A Hipril – A
لا يستعمل في نوبات الربو الحادة ، الإرضاع ، يستعمل بحذر في أمراض الكبد ، المسنين ، الحمل فئة B	مضاد للحساسية .	<i>Chlorpheniramine</i>	هستادين Histadin
مضاد استطباب في التشنج الشديد والسمي للجملة العصبية المركزية ، داء باركنسون ، يعطى للضرورة القصوى في الحمل ، يجب تجنب الإرضاع عند اخذ العلاج ، يعطى بحذر للمصابين باضطرابات قلبية وعائية	الاضطرابات النفسية ، علاج مشاكل السلوك الشديدة عند الأطفال مفرطي الحركة ، اضطرابات التقلصات اللاإرادية	<i>Haloperidol</i>	هيادول Hayadol
ضخامة البروستات ، الزرق مغلق الزاوية ، قرحة المعدة والاثنى عشري ، الأمراض القلبية والكلوية الحادة الانتانات الفيروسية كالحماق وشلل الأطفال ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع ، لا يعطى مع الاندوسيد والأسبرين ، لا يعطى للأطفال دون سنتين ، يعطى بحذر في حالة الصرع.	التهاب الأنف التحسسي بأنواعه ، التحسس لغبار الطلع وحمل الكلى ، الإصابات الجلدية الارجية مثل الاكزيما ، التهاب الملتحة التحسسي .	<i>Dexamethasone + Dexchlorpheniramine + Ascorbic Acid (Vit .C)</i>	هيانيل Hayanil
يعطى خلال الحمل والإرضاع للضرورة فقط .	الأمراض الناشئة عن اضطراب ايض الكالسيوم ، لين العظام ، الكساح ، نقص الكالسيوم عند الأطفال حديثي الولادة ، سوء امتصاص الكالسيوم في حالات الكساح .	<i>Alfacalcidol</i>	ون – ألفا One – Alpha
لا يعطى خلال الحمل والإرضاع إلا للضرورة .	معالجة أعراض التهاب الأنف التحسسي الفصلي وتشتمل على : (العطاس ، سيلان الأنف ، حكة في الأنف وباطن الفم والحنجرة ، تدمع واحمرار العين) ، المعالجة العرضية للحكة الناجمة عن الشري الجلدي المزمن .	<i>Fexofendine HCL</i>	البرجي - ستوب Allergy-stop

لا يستعمل في حب الشباب ، وردية الوجه ، التهابات ما حول الفم ، يستعمل في الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصوى .	حالات الالتهابات الجلدية والحكة مثل الصدفية والتهابات سطحية .	Mometasone Furoate	اليكا Elica
يستعمل في الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصوى .	في حالات الالتهابات الجلدية والحكة المصاحبة بعدوى فطرية .	Mometasone Furoate + Miconazole Nitrate	اليكا M- Elica M
لا يستعمل في حب الشباب ، وردية الوجه ، الحكة الشرجية ، لا يستعمل في الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصوى .	لمعالجة المناطق الجلدية مفرطة التقرن مثل الاكزيما المزمنة ، الحزاز البسيط ، الطفح الجلدي والصدفية .	Mometasone Furoate + Salicylic acid	اليكا سال Elica sal
خلل وظائف الكلى ، التهاب الكبد الشديدي ، لا يستعمل في الحمل إلا للضرورة .	لإزالة الألم والشعور بالحرقان والأعراض الأخرى التي تنشأ عن تهيج الغشاء المخاطي للجزء السفلي من الجهاز البولي المتسبب عن العدوى بالميكروبات	Phenazopyridine HCL	يوريسبت Urisept
يعطى بحذر في حالات القصور الكلوي (أو الكبدي) الحمل فئة C في الأشهر الثلاثة الأولى وفئة D في الأشهر الأخيرة للحمل	في معالجة ارتفاع الضغط الشرياني يستخدم بمفرده أو مع خافضات أخرى	Valsartan	يونيفان Univan دايوفان Diovan

ملاحظات :

(١) تقسم الفئات بالنسبة للحمل كما مبين في الجدول التالي :

الفئة A	الفئة B	الفئة C	الفئة D
امن للحمل	في حالة الفائدة أكثر من الضرر	في الحالات الضرورية فقط	لا يستعمل أبداً

(٢) هناك شركات متنوعة بالنسبة للأسماء التجارية ولكن المذكورة هنا هي الأكثر شيوعاً .

(٣) الحساسية لأي نوع من العلاج يكون سبباً لمنع الاستعمال .

(٤) المحتويات : (٢٣٠) علاج .